

Document made available under the Patent Cooperation Treaty (PCT)

International application number: PCT/JP05/000736

International filing date: 21 January 2005 (21.01.2005)

Document type: Certified copy of priority document

Document details: Country/Office: JP
Number: 2004-012764
Filing date: 21 January 2004 (21.01.2004)

Date of receipt at the International Bureau: 24 March 2005 (24.03.2005)

Remark: Priority document submitted or transmitted to the International Bureau in compliance with Rule 17.1(a) or (b)



World Intellectual Property Organization (WIPO) - Geneva, Switzerland
Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) - Genève, Suisse

03. 2. 2005

日 本 国 特 許 庁
JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出 願 年 月 日 2 0 0 4 年 1 月 2 1 日
Date of Application:


出 願 番 号 特 願 2 0 0 4 - 0 1 2 7 6 4
Application Number:
[ST. 10/C]: [J P 2 0 0 4 - 0 1 2 7 6 4]

出 願 人 株式会社カネボウ化粧品
Applicant(s):

2 0 0 5 年 3 月 9 日

特許庁長官
Commissioner,
Japan Patent Office

小 川



出証番号 出証特 2 0 0 5 - 3 0 1 9 9 4 7

【書類名】 特許願
【整理番号】 P2004-0011
【あて先】 特許庁長官 殿
【国際特許分類】 A61K 7/48
【発明者】
 【住所又は居所】 神奈川県小田原市寿町 5 丁目 3 番 2 8 号 カネボウ株式会社 化粧品研究所内
 【氏名】 池本 毅
【発明者】
 【住所又は居所】 神奈川県小田原市寿町 5 丁目 3 番 2 8 号 カネボウ株式会社 基礎科学研究所内
 【氏名】 小宮 亜矢
【発明者】
 【住所又は居所】 神奈川県小田原市寿町 5 丁目 3 番 2 8 号 カネボウ株式会社 基礎科学研究所内
 【氏名】 原武 昭憲
【特許出願人】
 【識別番号】 000000952
 【氏名又は名称】 カネボウ株式会社
 【代表者】 帆足 隆
 【電話番号】 03-5446-3575
【手数料の表示】
 【予納台帳番号】 010205
 【納付金額】 21,000円
【提出物件の目録】
 【物件名】 特許請求の範囲 1
 【物件名】 明細書 1
 【物件名】 要約書 1

【書類名】特許請求の範囲

【請求項 1】

オイゲニルグリコシドを配合することを特徴とするシワ改善剤。

【請求項 2】

オイゲニルグリコシドが、オイゲニル- β -D-グルコシドであることを特徴とする、請求項 1 記載のシワ改善剤。

【書類名】明細書

【発明の名称】シワ改善剤

【技術分野】

【0001】

本発明は、老化に伴い、特に露光部位に発生するシワの改善効果に優れ、皮膚を皮膚科学的及び美容的に健やかな状態に保つ効果を有するオイゲニルグリコシドを含有するシワ改善剤に関する。

【背景技術】

【0002】

ヒトをはじめとするすべての生物の臓器は、誕生して成長した後、加齢に伴って徐々に衰え、やがて機能停止し、機能停止した部分がある一定以上になると死に至る。その機能が徐々に衰えて行く状態を老化と呼んでいる。皮膚は、まわりの環境から直接影響を受けており、生体内部の環境を維持する重要な機能を持っているため全てが機能停止に至ることはあまりないが、シワ、シミ、くすみ、タルミなど老化徴候が顕在化しやすい臓器であり、日光に暴露される露光部位では特に顕著である。

【0003】

皮膚の老化が進行すると、酸化ストレスなどの刺激に対する防御が弱まり、皮膚内部環境を乱す原因となり、さらに老化を進める。特に、露光部位では紫外線照射などが原因となる強い酸化ストレスに常に曝されていることから、老化の進行が顕著である。このような皮膚の変化を光老化と呼んでおり、そのような皮膚では、表皮が肥厚し、真皮では大多数を占める構成成分であるコラーゲンが減少することにより皮膚表面でシワが深く大きくなるなど美容上も好ましくない状態となる。

【0004】

光老化が進行した結果生じるシワに対して改善効果を有する物質として、米国ではレチノイン酸が処方箋薬として用いられているが、副作用が強く安全性にも問題があるため、我が国では承認に至っていない。また、体内に吸収された後レチノイン酸に転換され効果を発揮すると言われているレチノール（ビタミンA）や抗酸化及びコラーゲン合成促進効果を持つアスコルビン酸（ビタミンC）、抗酸化効果の強いトコフェロール（ビタミンE）などシワ改善物質として提案されているが（例えば、特許文献1、2参照）、これらは十分に満足する効果が得られない欠点があった。したがって、これまでにシワを改善する物質として、十分に満足する効果を有し、安全性も有するものはなかった。

【0005】

オイゲノールは、香辛料の丁字に含まれる香気成分として、また歯痛などの抑制剤として一般的に用いられているだけでなく面局所適用部位への塗布による血流促進効果、メラニン生成抑制効果、真皮コラーゲン線維再構築剤などの応用が知られているが（例えば、特許文献3、4、5参照）、特異臭を有していることや高濃度で用いた場合には感作性を誘発することが問題とされている（例えば、非特許文献1参照）。

【0006】

本発明者らはオイゲノールを配糖体化することにより、これらの問題を改善できることを見出し、養毛料や人体表面用徐放性芳香組成物などを提案しているが（特許文献6、7参照）、オイゲノール配糖体のシワの改善効果についてはなんら検討が為されていなかった。

【0007】

【特許文献1】特開平7-165567号公報

【特許文献2】特開昭62-164609号公報

【特許文献3】特開平9-249549号公報

【特許文献4】特開平6-227959号公報

【特許文献5】特開2002-104921号公報

【特許文献6】特開平9-40531号公報

【特許文献7】特開平7-179328号公報

【非特許文献1】Contact Dermatitis, 1992年, 第27号,
p. 98-104

【発明の開示】

【発明が解決しようとする課題】

【0008】

本発明の目的は、オイゲニルグリコシドを配合することによる美容的にも健やかな皮膚に保つ効果に優れたかつ特に露光部位で顕著に顕在化するシワの改善効果に優れた作用を有するシワ改善剤を提供することにある。

【課題を解決するための手段】

【0009】

本発明者らは、上記のようなことをからみて、オイゲノール誘導体を中心に鋭意研究を行った結果、オイゲニルグリコシドを配合したシワ改善剤が美容的にも健やかな皮膚に保つ効果に優れたかつ特に露光部位で顕著に顕在化するシワの改善効果に優れた作用を有する老化により、特に露光部位で顕著に出現するシワを改善する作用に優れることを確認して本発明を完成するに至った。即ち、本願第1の発明は、オイゲニルグリコシドを配合することを特徴とするシワ改善剤である。また第2の発明は、オイゲニルグリコシドが、オイゲニル- β -D-グルコシドであることを特徴とする、前記のシワ改善剤である。

【発明の効果】

【0010】

本発明は、加齢に伴い特に露光部位に発生するシワの改善効果に優れ、皮膚を皮膚科学的及び美容的に健やかな状態に保つシワ改善剤を提供することができる。

【発明を実施するための最良の形態】

【0011】

以下、本発明の実施の形態を詳述する。オイゲノールは、香辛料の丁字に含まれる香気成分として一般的に知られている。オイゲノールは、鎮痛効果を有することが知られており、歯痛などの抑制剤としても用いられている。本発明のオイゲニルグリコシドは、オイゲノールを定法によってO-グリコシド結合により配糖体化することにより得ることができる。

【0012】

本発明のオイゲニルグリコシドの糖残基は、単糖類又は少糖類であり、具体的にはグルコース、ガラクトース、キシロース、ラムノース、マンノース、グルコサミン、ガラクトサミンなどの単糖類、ラクトース、マルトース、シュークロース、セロビオース、ゲンチビオースなどの二糖類を挙げることができる。また、配糖体には α 結合及び β 結合を有する異性体が存在するが、そのどちらでも、あるいはそれらの混合物としても用いることができる。本発明では、オイゲノールのD-グルコース配糖体で β 結合を有するオイゲニル- β -D-グルコシドが、効果の面から特に好ましく用いられる。

【0013】

本発明のオイゲニルグリコシドの配合量は、シワ改善剤の総量を基準として、0.3～5.0質量%が好ましい。0.3質量%未満の配合量では、本発明の目的とする効果が十分でなく、一方、5.0質量%を越えて配合しても、その増加分に見合った効果の向上がなく好ましくない。

【0014】

本発明のシワ改善剤は、皮膚化粧品や外用剤として医薬品や入浴剤等に適用でき、剤型的には例えばローション類、乳液類、クリーム類、パック類等とすることができる。尚、本発明のシワ改善剤には上記の他に色素、香料、防腐剤、界面活性剤、顔料、抗酸化剤等を本発明の目的を達成する範囲内で適宜配合することができる。

【実施例】

【0015】

以下、実施例及び比較例に基づいて本発明を詳説する。

【0016】

実施例 1～3 及び比較例 1、2

本発明のシワ改善剤を、光老化させた皮膚に適用したときのシワ改善効果を、次の試験方法により調べた。

【0017】

(試験方法)

1. 実施例及び比較例、試験で使用した実験動物

実施例 1～2: 5.0% (v/v) エタノール水溶液 (基剤) にオイゲニル-β-D-グルコシドを下記表 1 の濃度で配合した。

比較例: 基剤のみのものを比較例 1、オイゲノールを表 1 の濃度で配合したものを比較例 2 とした。

実験動物: 試験開始時 10 週齢のヘアレスマウス 1 群 10 匹を用いた。

【0018】

2. シワ改善効果の評価

2-1. 光老化条件及び評価方法

光老化は、UVA と B を 1 日 1 回、週 5 回、8 週間連続照射することで誘発させた。UVA が 20 J/cm^2 、 25 J/cm^2 、 30 J/cm^2 、UVB が 20 mJ/cm^2 、 30 mJ/cm^2 、 40 mJ/cm^2 と 1 週ごとに照射量を増量し、3 週目以降は最大量を照射した。シワ改善効果は、シワスコア、真皮コラーゲン量、表皮厚により評価した。

シワスコア: Bissett らの方法 (Photochem Photobiol 46: 367-378, 1987) に従って採点した。すなわち、シワの大きさ及び深さを肉眼で総合的に評価し、「大きく深いシワが確認できる」を 3、「シワが確認できる」を 2、「シワが確認できない」を 1、「正常なキメが観察される」を 0 と 4 段階で採点した。真皮コラーゲン量: 全層皮膚を採取してポリトロンホモジナイザー (KINEMATICA 社製) で破碎後、コラーゲン画分を抽出して酸加水分解後、ヒドロキシプロリン含有量をアミノ酸分析装置 (日本分光製) を用いて定量した。 1 cm^2 当たりのヒドロキシプロリン量を真皮コラーゲン量の相対的指標とした。

表皮厚: 全層皮膚を採取して定法に従って皮膚切片標本を作製したのちヘマトキシリン・エオシン染色を施し、表皮の厚さを画像解析ソフト (マイクロアナライザー、日本ポラデジタル社製) で測定した。

【0019】

2-2. 操作

評価試料 0.1 mL をヘアレスマウスの背部皮膚 (直径約 2.5 cm) に 1 日 1 回、1 週間に 5 回の頻度で、UV 照射開始後 5 週目から照射終了後 4 週目まで塗布した。そして、最終塗布終了後にシワスコアを採点した。屠殺後、皮膚を採取し、コラーゲン含有量 (1 cm^2 当たりのヒドロキシプロリン量) と表皮厚を測定した。シワ改善効果は、シワスコア、コラーゲン含有量、表皮厚を、基剤のみを塗布した比較例 1 と比較することにより評価した。

【0020】

【表 1】

群	シワスコア*)
実施例 1 (オイゲニル-β-D-グルコシド 0.2 質量% 配合) 塗布	2.4 ± 0.1
実施例 1 (オイゲニル-β-D-グルコシド 2.0 質量% 配合) 塗布	2.2 ± 0.2
実施例 1 (オイゲニル-β-D-グルコシド 0.2 質量% 配合) 塗布	2.1 ± 0.1
比較例 1 (基剤のみ) 塗布	2.6 ± 0.1
比較例 2 (オイゲノール 2.0 質量% 配合) 塗布	2.7 ± 0.1

*) 数値は、平均値 ± 標準誤差

【0021】

シワスコアの採点値を表1に示す。実施例1～3のシワ改善剤塗布群は、比較例1と比較して有意に低いシワスコア値を示し、光老化により誘発したシワに対し、オイゲニルグリコシドを配合したシワ改善剤が有効であることを示した。また、比較例2のオイゲノール配合のシワ改善剤にはシワスコアにおける改善効果は認められなかった。

【0022】

【表2】

群	コラーゲン含有量 ^{*)} ($\mu\text{mol}/\text{cm}^2$)	表皮厚 ^{*)} (μm)
実施例1塗布	8.8 \pm 0.4	42.5 \pm 2.3
実施例2塗布	9.2 \pm 0.4	41.2 \pm 4.4
実施例3塗布	9.3 \pm 0.6	38.6 \pm 1.6
比較例1塗布	8.1 \pm 0.2	57.5 \pm 6.8
比較例2塗布	7.8 \pm 0.5	61.1 \pm 2.6

^{*)} 数値は、平均値 \pm 標準誤差

【0023】

表2にコラーゲン含有量(ヒドロキシプロリン量)、表皮厚を測定した結果を示す。実施例1～3のシワ改善剤塗布群は、比較例1と比較して有意に高いコラーゲン含有量を示し、光老化により減少する真皮コラーゲン量に対し、オイゲニルグリコシドが有効であることを示した。また、比較例2のオイゲノール配合のシワ改善剤には光老化により減少する真皮コラーゲン量に対して効果は認められなかった。

【0024】

表皮厚においては、実施例1～3のシワ改善剤塗布群は、比較例1と比較して有意に薄い表皮厚を示し、光老化により肥厚する表皮に対し、オイゲニルグリコシドが肥厚を軽減する効果を有することを示した。一方、比較例2のオイゲノール配合のシワ改善剤には光老化により肥厚する表皮厚を軽減する効果は認められなかった。尚、シワ改善効果が認められているレチノイン酸を本評価系に適用した場合、シワスコア及びコラーゲン含有量には有効であるが、表皮厚に関しては肥厚を増進する方向に働くことが示された。この表皮を肥厚させる作用が安全性を問題視する要因のひとつとなっていた。オイゲニルグリコシドにはそのような作用もなく、通常の安全性試験においても何等問題はなかった。

【0025】

本試験の結果から実施例1から3のオイゲニルグリコシド塗布群が、比較例1と比較して明らかに、光老化によるシワを改善する効果を有することが分かる。また、光老化によるシワを改善する効果は、オイゲノール自体には無く、配糖体化することで初めて効果を有するようになることが分った。

【0026】

実施例4、比較例3(スキンローション)

下記組成のスキンローションを下記の調製法に従って調製し、それを試料として次の操作によって、シワ改善効果を評価した。5名の目尻にシワのある健常人(女性、44～55歳)を被検者として、実施例4及び比較例3のスキンローションそれぞれを、左右のどちらかに決めて、朝洗顔後、及び夕方入浴後の1日2回、2ヵ月間(60日)連続で目尻のシワの部分(各試料ごとに目尻を中心に約4cm²、2×2cm)に約0.2mLずつ塗布してもらった。そして最終塗布後に左右の目尻部分の皮膚(シワ)の状態に関しアンケートに答えてもらった。

【0027】

(組成)

原料成分

配合量(質量%)

出証特2005-3019947

A成分

(1) オリーブ油	10.0
(2) ミリスチン酸イソプロピル	1.0
(3) モノラウリン酸	
ポリオキシエチレン (20) ソルビタン	0.5
(4) プロピレングリコール	1.0
(5) グリセリン	2.0

B成分

(6) メチルパラベン	0.1
(7) エタノール	7.0
(8) 精製水	残 量

C成分

(9) オイゲニル- β -D-グルコシド	2.0 (実施例4)
	又は 0 (比較例3)

【0028】

(製法)

C成分のオイゲニル- β -D-グルコシドをB成分に添加して均一に溶解した後、A成分を添加して混合攪拌分散し、次いで容器に充填した。使用時には内容物を均一に振盪分散して使用した。

【0029】

アンケート結果をもとに、皮膚(シワ)の状態に関する各項目において、比較例3より実施例4のスキナーションのほうが有効であると回答した人数を以下に示す。

【0030】

項目	人数(名)
シワが目立たなくなった	5
皮膚が柔らかくなった	4
皮膚にハリがでた	5
皮膚につやがでた	3
皮膚があかるくなった	4

【0031】

本試験結果から実施例4のスキナーションは、比較例3と比較して明らかにシワを改善しており、さらに、光老化により悪化する柔軟性や色調までもが改善されたことが分かる。また、本発明のスキナーションによる刺激や痒み等の皮膚の異常は認められなかった。

【0032】

実施例5 (スキナーション)

オイゲニル- β -D-グルコシドを配合したスキナーションを下記組成と製法にて調製し、事前アンケートで目尻のシワを肌悩みとして挙げた20名の健康人(女性、50~55歳)に1週間以上使用してもらいアンケート調査を行った。

【0033】

(組成)

原 料 成 分	配合量(質量%)
A成分	
(1) 密ロウ	2.0
(2) ステアリン酸	5.0
(3) ステアリアルアルコール	5.0
(4) 還元ラノリン	2.0

(5) スクワレン	20.0
(6) モノステアレートソルビタン	3.0
(7) モノステアレート ポリオキシエチレン (20) ソルビタン	3.0
(8) プロピレングリコール	5.0

B成分

(9) メチルパラベン	0.2
(10) 精製水	残 量

C成分

(11) オイゲニル- β -D-グルコシド	2.0
------------------------------	-----

【0034】

(製法)

C成分のオイゲニル- β -D-グルコシドをB成分に配合した後、A、B成分を各々80℃に加熱溶解し、混合して攪拌しつつ、30℃まで冷却してスキนครリームを調製した。

【0035】

実施例5のスキนครリームを被験者に1週間以上使用してもらった後、シワの状態に関して下記項目のアンケート調査を行った。各項目ごとに使用前と比較して使用後に思うと回答した人の人数を以下に示した。

【0036】

項目	人数 (名)
シワが目立たなくなった	19
シワの大きさが減少した	17
シワの数が減少した	5
シワが増えた	0

【0037】

本評価結果から実施例5のスキนครリームは、使用前と比較してシワが目立たなくなったと実感しているヒトがほぼ全員で、その要因としてシワの数よりもシワの大きさを軽減することで、光老化によるシワを改善したことが分かる。また、本発明のスキนครリームによる刺激や痒み等の皮膚の異常は認められなかった。

【産業上の利用可能性】

【0038】

皮膚化粧品や外用剤として医薬品や入浴剤等に適用でき、剤型的には例えばローション類、乳液類、クリーム類、パック類等とすることができ、皮膚の美容の面から非常に有用である。

【書類名】 要約書

【要約】

【目的】 光老化により出現するシワの改善効果に優れたシワ改善剤を提供する。

【構成】 本発明は、オイゲニルグリコシドを含有するシワ改善剤。

【選択図】 なし

認定・付加情報

特許出願の番号	特願 2004-012764
受付番号	50400094874
書類名	特許願
担当官	関 浩次 7475
作成日	平成16年 1月23日

<認定情報・付加情報>

【提出日】

平成16年 1月21日

【書類名】 出願人名義変更届
【提出日】 平成16年 8月 5日
【あて先】 特許庁長官殿
【事件の表示】
【出願番号】 特願2004- 12764
【承継人】
【識別番号】 504180206
【氏名又は名称】 株式会社カネボウ化粧品
【代表者】 知識 賢治
【電話番号】 03-5446-3871
【譲渡人】
【識別番号】 000000952
【氏名又は名称】 カネボウ株式会社
【代表者】 中嶋 章義
【手数料の表示】
【予納台帳番号】 257903
【納付金額】 4,200円
【提出物件の目録】
【物件名】 承継人であることを証明する書面 1
【提出物件の特記事項】 手続補足書で提出

特願2004-012764

ページ: 1

出願人履歴情報

識別番号

[000000952]

1. 変更年月日
[変更理由]
住所
氏名

2001年 1月 4日
名称変更
東京都墨田区墨田五丁目17番4号
カネボウ株式会社

出証番号 出証特2005-3019947

特願 2004-012764

ページ: 2/E

出願人履歴情報

識別番号

[504180206]

1. 変更年月日 2004年 5月10日
[変更理由] 新規登録
住所 東京都港区海岸3丁目20番20号
氏名 株式会社カネボウ化粧品
2. 変更年月日 2004年10月12日
[変更理由] 住所変更
住所 東京都港区虎ノ門5丁目11番2号
氏名 株式会社カネボウ化粧品
3. 変更年月日 2004年10月22日
[変更理由] 住所変更
住所 東京都港区海岸3丁目20番20号
氏名 株式会社カネボウ化粧品
4. 変更年月日 2004年12月28日
[変更理由] 住所変更
住所 東京都港区虎ノ門5丁目11番2号
氏名 株式会社カネボウ化粧品

出証番号 出証特2005-3019947